Протокол ультразвукового исследования сердца (эхокардиограмма)

ФИО Каранина

Кличка: йоркширский терьер Тесси, 10 лет.

Левое предсердие : _18мм__слабо_расширено Лп/Ао__1,85

Левый желудочек:

Гипертрофия__нет__ Дилатация____нет_____Систолическая функция миакарда ЛЖ:___не_____нарушена Нарушение локальной сократимости ЛЖ_нет

МЖПд_3,9_мм; ЗСЛЖд_4,2_мм; КДР:_21,4_мм ;КСР:_8,2_мм;ФУ:___62__% ;

Митральный клапан:___изменен; Створки_умеренно деформированы и _уплотнены ;кальциноз створок__нет_

Регургитация МК мин 1-2ст, 3 м/с , пик Е 0,74м/с А 0,43м/с

Аорта__не__уплотнена__не__расширена; Ао_9,7мм_

Аортальный клапан: створки__не уплотнены _Vmax_0,9м/с_____

Легочная артерия : не изменена, клапан без особеностей, рег 1ст(0,57м/с). ФК 10,6, ствол 9,9мм, V =1м/с, ЛГ по форме полтока не выявлено.

Правое предсердие:_13,1мм, не____расширено.

Правый желудочек: 10мм_не__расширен.

Трикуспидальный клапан:_изменен; Створки_незначительно уплотнены и не деформированы, кальциноз створок_нет__

Регургитация ТК_1 ст, 1,6м/с_

Дефект МЖП__нет__Дефект МПП____нет_

Перекардиальная жидкость:_не__обнаружена; Плевральная жидкость:_____не_____обнаружена

Дополнительно:_____

Заключение: Дегенеративные изменения митрального и трукуспидального клапанов, начало ремаделирования ЛП, ХСН ФК 1А

Рекомендовано:

противопаказаний к проведению анестезии не выявлено

мексидол 25 мг 1 раз а день в течении недели до операции и неделю после

кудесан по 5 капель 2 раза вдень 1 месяц

начать прием через сутки после анестезии: вазотоп 1,25мг по ¼ тб 1 раз вдень 3 дня, по ½ тб 1 разв день 3 дня, по ¾ тб — 1 раз в день пожизненно

ЭХО кг повторить планово через 6 месяцев, или ранее в случае появления одышки или ЧДД во сне более 27

Врач:___Максимович Е.Б._____ Дата:__22-04—2016года___