Протокол ультразвукового исследования сердца (эхокардиограмма)

ФИО Боталова Е И Порода: французский бульдог Кличка: Джон

Левое предсердие : __27,3мм_не _расширено, Лп/Ао_1,5

Левый желудочек:

Гипертрофия_нет_ Дилатация___нет_____

Систолическая функция миакарда ЛЖ:__ссохранена

Нарушение локальной сократимости ЛЖ_не выявлено

МЖПд_6,2мм

КДР:_30,7мм ;КСР: 18,3мм;

ЗСЛЖд_ 7,4мм

ФУ: 41% ;

Митральный клапан:_не изменен

Регургитация МК 1ст 0,9м/с пик Е= 0,43; А=0,92м/с

Аорта_, _не__уплотнена__не__расширена; Ао_17,4мм_

Аортальный клапан: створки__ уплотнены _Vmax_0,85м/с, рег не выявлена.

Легочная артерия : ФК 15,6мм, ствол не расширен 15,6мм, клапан не изменен V макс=10,71м/с, рег 0-1ст,

Правое предсердие:_20мм, не____расширено. В полость выпирает обоазование(диаметр в полости 12*15мм), визуально произрастаюшее из области основания сердца, диаметр образования примерно 3,7см.

Правый желудочек: 10,7мм(не расширен), стенка до 3,3мм(не утолщена)

Трикуспидальный клапан: не изменен _пик Е 0,64 пик А 0,26м/с

Регургитация ТК_1ст

Перикардиальная жидкость: до 2-3мм; Плевральная жидкость:_нет

Дополнительно:_выявлено образование в области основания сердца

Заключение: начальная диастолическая дисфункция ЛЖ, дилатации камер не выявлено. Выявлено новообразование основания сердца, наиболее вероятно симптом асцита связан с компресией сосудов и ПП образованием.

Врач:___Максимович Е.Б._____ Дата:__20-05-2016г

Рекомендовано: 16,2кг(с асцитом)

консультация онколога Шевченко И.А.

Антибиотико терапию продолжать

фуросемид 40 мг по ¼ тб 2 раза в день 7 дней или по 10 мг вм- возможно дольше, если потребуется пожзненная терапия добавить верошпирон 25мг по ½ тб 2 раза вдень

панангин 1 тб 2 раза в день 10 дней