neovet

8 (800) 775-26-58
КРУГЛОСУТОЧНО

Номер анализа: 1245594

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ. СТАНДАРТ

Дата сдачи анализа:	**21.06.2020**	Направление:	**k363128_399933_210620_537420**
Дата проведения анализа:	**22.06.2020**	Животное:	**Кошка**
Владелец животного:	**Лыткина Т.К.**	Порода:	**Донской сфинкс**
Название клиники:	**АЛЬФ**	Возраст:	**14 лет 0 месяцев**
Лечащий врач:	**Врач не указан**	Кличка:	**Ника**
Материал:	**Сыворотка крови**	Пол:	**Ж**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Билирубин общий	3,8	2-10 для котят до 3-х мес <4	мкмоль/л
Билирубин прямой	0,8	0-5,5	мкмоль/л
АСТ	43	9-45 для котят до 6-ти мес 0-30	ед./л
АЛТ	77	18-79 для котят до 3-х мес 10-50	ед./л
Коэффициент Ритиса	0.6	1,0-1,7	
Мочевина	8,8	5,4-12,1	ммоль/л
Креатинин	56	70-165 для котят до 6-ти мес 29-110	мкмоль/л
Общий белок	82	54-79 для котят до 3-х мес 33-75	г/л
Альбумин	40	24-38 для котят до 3-х мес 20-28	г/л
Глобулин	42.0	16-55	г/л
Щел. фосфатаза	105	0-55 для котят до 3-х мес <550, 3-6 мес 30-350, 6-12 мес - <200	ед./л
а-Амилаза	601	500-1200 для котят до 12-ти мес <1800	ед./л
Глюкоза	5,98	3,3-6,3 для котят до 6-ти мес 3,85-8,25	ммоль/л
ЛДГ	458	35-220 для котят до 6-ти мес 60-440	ед./л

Исследование провёл: Варенов Д. В.

neovet

8 (800) 775-26-58
КРУГЛОСУТОЧНО

Номер анализа: 1245598

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ+ЛЕЙКОГРАММА(МИКРОСКОПИЯ)+СОЭ

Дата сдачи анализа:	**21.06.2020**	Направление:	**k363128_399933_210620_537420**
Дата проведения анализа:	**22.06.2020**	Животное:	**Кошка**
Владелец животного:	**Лыткина Т.К.**	Порода:	**Донской сфинкс**
Название клиники:	**АЛЬФ**	Возраст:	**14 лет 0 месяцев**
Лечащий врач:	**Врач не указан**	Кличка:	**Ника**
Материал:	**Кровь**	Пол:	**Ж**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ		НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Гематокрит (PCV)	39.3		29-48 для котят до 3-х мес 27-36	%
Гемоглобин (Hb)	130		90-150 для котят до 3-х мес 80-120	г/л
Эритроциты (RBC)	9,00		5,6-10 для котят до 3-х мес 4,5-7,5	x10[12]/л
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	14.4		14-19	Пг
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	33.1		32-38	%
Средний объём эритроцита (MCV)	43,7		39-53	мкм[3](фл)
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	18,2		14-18	%
СОЭ (ESR)	1		0-13	мм/ч
Лейкоциты (WBC)	10,64		5,5-18,5	x10[9]/л
Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов (nRBC)	0		0-5	
Скорректированное количество лейкоцитов	10.6		5,5-18,5	x10[9]/л
Лейкограмма	Относительное значение, %	Абсолютное значение x10^9/л		
Нейтрофильные миелоциты (Myelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Нейтрофильные метамиелоциты (Metamyelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	0	0.0	0-0,555	x10[9]/л
Сегментоядерные нейтрофилы (Neu)	44	4.7	1,925-13,875	x10[9]/л
Эозинофилы (Eos)	9	1.0	0-1,110	x10[9]/л
Моноциты (Mon)	4	0.4	0,055-0,740	x10[9]/л
Базофилы (Bas)	0	0.0	0-0,055	x10[9]/л
Лимфоциты (Lym)	43	4.6	1,375-10,175	x10[9]/л
Другое	0	0.0	0	x10[9]/л
Тромбоциты (PLT)	372		160-630	x10[9]/л

При оценке лейкоцитарной формулы вначале необходимо обратить внимание на общее количество лейкоцитов. Затем обратить внимание на абсолютные числа в лейкоформуле. Процентное содержание используется только для подсчета абсолютных чисел, так как сами по себе процентные значения могут вводить в заблуждение.

Исследование провёл: Варенов Д. В.

ВЕТЕРИНАРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Ветеринарный центр Ирины Оныщук
ул. Молодцова, д. 4а
тел/факс: (499) 477-24-44
тел.: 506-90-35

ПРОТОКОЛ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Ф.И.О. владельца: Лыткина; Животное: кошка Ника, сфинкс, 14 лет

Свободная жидкость: не лоцируется.

Почки:

правая 35 х 19,4 мм, ровная, овальная, к/м дифференциация сглажена, собирательная система не расширена, лоханка без признаков минерализации, пиелоэктазия не лоцируется. Сосудистый рисунок не усилен. Мочеточник визуализируется. Кортикальный слой – 6мм. В кортикальном слое почки – усиление эхогенности.

левая 36,1 х 20,7мм, ровная, овальная, к/м дифференциация сглажена, собирательная система не расширена, лоханка не расширена. Сосудистый рисунок не усилен. Мочеточник визуализируется. Кортикальный слой – 5.2мм. В кортикальном слое почки – усиление эхогенности.

Мочевой пузырь: хорошо наполнен. Стенка утолщена, 2,1мм, содержимое гиперэхогенное, в просвете регистрируется большое количество гиперэхогенного осадка (клеточный детрит, слизь, органический осадок). Уролитов не лоцируется.

Селезёнка: не увеличена, края ровные, паренхима эхогенная, однородная, сосудистый рисунок ярко выражен. Линейный размер – 10,2мм. В паренхиме визуализируется несколько кальцинатов от 4.7 до 6мм.

Лимфатические узлы: выраженный мезаденит до 12.8мм.

Печень: не увеличена, эхогенность паренхимы не повышена, однородная, мелкозернистая, сосудистый рисунок ярко выражен, внутрипечёночные желчные протоки не расширены. Новообразований не лоцируется.

Желчный пузырь: не расширен, содержимое гомогенное, осадок не визуализируется, стенка не уплотнена, 1,2мм. Диаметр – 23,5 х 12,1мм, пузырный проток – 1,2мм. Новообразований/конкрементов не лоцируется.

ЖКТ: Стенка желудка – 3,1мм, складчатость выражена, пустой. Петли кишечника отечные, перистальтика сохранена. Толщина тонкого отдела кишечника до 2,5мм. 12 перстная кишка – 2.8мм. Повышенная пневматизация желудочно – кишечного тракта не лоцируется.

Маятникообразных движений не лоцируется.

Дифференциация слоев сохранена.

Инородных предметов не лоцируется.

Выраженная лимфангиэктазия.

Поджелудочная железа: не реактивная, не увеличена, размер правой доли – 3,7мм. Проток не расширен, 1мм.

Заключение: эхо-признаки усиления эхогенности медуллярного слоя почек, хронических структурных изменений в паренхиме почек, лимфангиэктазии, мезаденита, гастродуоденита, образования большого количества гиперэхогенного осадка в просвете мочевого пузыря.

28.08.2020 Ветеринарная клиника ИП Оныщук И.А. ЦВДЛ № 00605 г. Москвы ул. Молодцова д. 4А, тел.: 8 (499) 477-24-44 Ветеринарный врач Мамонтовская Дарья Алексеевна