neovet 8-800-775-26-58 КРУГЛОСУТОЧНО

Номер анализа: 3664887

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ+ЛЕЙКОГРАММА(МИКРОСКОПИЯ)+СОЭ

Дата сдачи анализа:	**27.09.2023**	Направление:	**k1058962_1141477_270923_1575682**
Дата проведения анализа:	**27.09.2023**	Животное:	**Кошка**
Владелец животного:	**Макарова**	Порода:	**Бенгальская**
Название клиники:	**АСТИН (Лескова)**	Возраст:	**2 лет 10 месяцев**
Лечащий врач:	**Врач не указан**	Кличка:	**Гриша**
Материал:	**Кровь**	Пол:	**М**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ		НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Гематокрит (PCV)	39.8		29-48 для котят до 3-х мес 27-36	%
Гемоглобин (Hb)	156		90-150 для котят до 3-х мес 80-120	г/л
Эритроциты (RBC)	10,19		5,6-10 для котят до 3-х мес 4,5-7,5	x10[12]/л
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	15.3		14-19	Пг
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	39.2		32-38	%
Средний объём эритроцита (MCV)	39,1		39-53	мкм[3](фл)
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	18,8		14-18	%
СОЭ (ESR)	18		0-13	мм/ч
Лейкоциты (WBC)	16,70		5,5-18,5	x10[9]/л
Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов (nRBC)	0		0-5	
Скорректированное количество лейкоцитов	16.7		5,5-18,5	x10[9]/л
Лейкограмма	Относительное значение, %	Абсолютное значение x10^9/л		
Нейтрофильные миелоциты (Myelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Нейтрофильные метамиелоциты (Metamyelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	0	0.0	0-0,555	x10[9]/л
Сегментоядерные нейтрофилы (Neu)	80	13.4	1,925-13,875	x10[9]/л
Эозинофилы (Eos)	0	0.0	0-1,110	x10[9]/л
Моноциты (Mon)	4	0.7	0,055-0,740	x10[9]/л
Базофилы (Bas)	0	0.0	0-0,055	x10[9]/л
Лимфоциты (Lym)	16	2.7	1,375-10,175	x10[9]/л
Другое	0	0.0	0	x10[9]/л
Тромбоциты (PLT)	441		160-630	x10[9]/л

Прочее:

MCHC – значение более 38,5 г/дл – гемолиз (внутрисосудистый или в следствие нарушений преаналитического этапа); хилез (недостаточная голодная диета, заболевания печени, нарушения обмена веществ – сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение); изменение формы эритроцитов в следствие нарушения пропорций «кровь/антикоагулянт» - кровь должна набираться в пробирку до метки.

MCHC – значение более 38,5 г/дл – гемолиз (внутрисосудистый или в следствие нарушений преаналитического этапа); хилез (недостаточная голодная диета, заболевания печени, нарушения обмена веществ – сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение); изменение формы эритроцитов в следствие нарушения пропорций «кровь/антикоагулянт» - кровь должна набираться в пробирку до метки.

Исследование провёл: Шаталова М. Н.

Общество с ограниченной ответственностью "НЕОВЕТ" (ООО "НЕОВЕТ") ОГРН 1117746178659 ИНН 7726697072 * МОСКВА * neovet Для анализов