neovet 8-800-775-26-58 КРУГЛОСУТОЧНО

Номер анализа: 4358756

РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ+ЛЕЙКОГРАММА(МИКРОСКОПИЯ)+СОЭ+РЕТИКУЛОЦИТЫ. КОШКИ

Дата сдачи анализа: **26.05.2024**
Дата проведения анализа: **27.05.2024**
Владелец животного: **Савченко**
Название клиники: **Соловьева Анна Владимировна 428**
Лечащий врач: **Врач не указан**
Материал: **Кровь**

Направление: **k1244608_1340218_260524_1865648**
Животное: **Кошка**
Порода: **Метис**
Возраст: **4 лет 0 месяцев**
Кличка: **Кнопа**
Пол: **Ж**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ		НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Гематокрит (PCV)	21.3 ↓		29-48 для котят до 3-х мес 27-36	%
Гемоглобин (Hb)	59 ↓		90-150 для котят до 3-х мес 80-120	г/л
Эритроциты (RBC)	4,49 ↓		5,6-10 для котят до 3-х мес 4,5-7,5	x10[12]/л
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	13.1 ↓		14-19	Пг
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	27.7 ↓		32-38	%
Средний объём эритроцита (MCV)	47,5		39-53	мкм[3](фл)
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	16,2		14-18	%
СОЭ (ESR)	75 ↑ ↑		0-13	мм/ч
Лейкоциты (WBC)	26,29		5,5-18,5	x10[9]/л
Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов (nRBC)	0		0-5	
Скорректированное количество лейкоцитов	26.3		5,5-18,5	x10[9]/л
Лейкограмма	Относительное значение, %	Абсолютное значение x10^9/л		
Нейтрофильные миелоциты (Myelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Нейтрофильные метамиелоциты (Metamyelocyte)	0	0.0	0	x10[9]/л
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	0	0.0	0-0,555	x10[9]/л
Сегментоядерные нейтрофилы (Neu)	92	24.2	1,925-13,875	x10[9]/л
Эозинофилы (Eos)	0	0.0	0-1,110	x10[9]/л
Моноциты (Mon)	2	0.5	0,055-0,740	x10[9]/л
Базофилы (Bas)	0	0.0	0-0,055	x10[9]/л
Лимфоциты (Lym)	6	1.6	1,375-10,175	x10[9]/л
Другое	0	0.0	0	x10[9]/л
Тромбоциты (PLT)	260		160-630	x10[9]/л
Агрегатные ретикулоциты	9		До 50	x10[9]/л
Пунктатные ретикулоциты	5		До 500	x10[9]/л

Оценка степени выраженности регенераторного ответа костного мозга на основании абсолютного количества ретикулоцитов, по отношению к присутствующей анемии у животного.

Агрегатные ретикулоциты:
Регенераторный ответ отсутствует - до 15x10[9]/л.
Слабый регенераторный ответ - до 50x10[9]/л.
Умеренный регенераторный ответ - до 100x10[9]/л.
Выраженный регенераторный ответ - более 200x10[9]/л.

Пунктатные ретикулоциты:
Регенераторный ответ отсутствует - до 200x10[9]/л.
Слабый регенераторный ответ - до 500x10[9]/л.

Выраженный регенераторный ответ - более 1500х10[9]/л.

Прочее:

МСНС – значение менее 32 г/дл – регенераторная анемия (появление в крови ретикулоцитов); хронические железодефицитные состояния (алиментарные, в следствие постоянной потери крови или нарушения метаболизма железа); потеря белка (желудочно-кишечные расстройства).

Изменения в эритроцитах. Морфологические признаки нарушения метаболизма клеточных мембран: акантоциты +++

Изменения в эритроцитах. Морфологические признаки регенеративного ответа: тельца Хауэлла-Жолли.

Изменения в эритроцитах. Морфологические признаки иммунообусловленных нарушений: агглютинация ++

Исследование провёл: Нигматулина А. И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НЕОВЕТ" ОГРН 1117746178658 ИНН 7726877077
neovet
Для анализов

neovet 8-800-775-26-58 КРУГЛОСУТОЧНО

Номер анализа: 4358754

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ. ВЕТСТАНДАРТ

Дата сдачи анализа: **26.05.2024**
Дата проведения анализа: **27.05.2024**
Владелец животного: **Савченко**
Название клиники: **Соловьева Анна Владимировна 428**
Лечащий врач: **Врач не указан**
Материал: **Сыворотка крови**

Направление: **k1244608_1340218_260524_1865648**
Животное: **Кошка**
Порода: **Метис**
Возраст: **4 лет 0 месяцев**
Кличка: **Кнопа**
Пол: **Ж**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Билирубин общий	1,2 ↓	2-10 для котят до 3-х мес <4	мкмоль/л
Билирубин прямой	0,6	0-5,5	мкмоль/л
АСТ	20	9-45 для котят до 6-ти мес 0-30	ед./л
АЛТ	24	18-79 для котят до 3-х мес 10-50	ед./л
Коэффициент Ритиса	0.8	1,0-1,7	
Мочевина	53 ↑ ↑	5,4-12,1	ммоль/л
Креатинин	426,3 ↑	70-165 для котят до 6-ти мес 29-110	мкмоль/л
Общий белок	53 ↓	54-79 для котят до 3-х мес 33-75	г/л
Альбумин	21 ↓	24-38 для котят до 3-х мес 20-28	г/л
Глобулин	32.0	16-55	г/л
Соотношение альбумин/глобулин	0.7	0,8-1,2	
Щел. фосфатаза	7	0-55 для котят до 3-х мес <550, 3-6 мес 30-350, 6-12 мес - <200	ед./л
а-Амилаза	2292 ↑ ↑	500-1200 для котят до 12-ти мес <1800	ед./л
Глюкоза	6,3	3,3-6,3 для котят до 6-ти мес 3,85-8,25	ммоль/л
Калий	4,99	3,6-5,5 для котят до 6-ти мес 3,7-5,9	ммоль/л
Натрий	163,5 ↑	144-158 для котят до 6-ти мес 143-160	ммоль/л
Фосфор	8,18 ↑ ↑	1,1-2,3 для котят до 6-ти мес 2-3,2	ммоль/л
Кальций	2,24	2-2,7 для котят до 6-ти мес 2,3-3	ммоль/л
Ионизированный кальций	1,12	1,1-1,3	ммоль/л
Хлор	132	107-129 для котят до 3-х мес 97-125	ммоль/л
Кислотность	7,47	7,35-7,50	ед.pH
Осмолярность	351.3	285-310	осмоль/л

Исследование провёл: Нигматулина А. И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕОВЕТ» ОГРН 1117746178659 ИНН 7726
neovet Для анализов

Дата : 27.05.2024
Клиент : Савченко А. В.
Кличка питомца: Кнопа
Номер карточки: 10213

Ветеринарный Центр Альф
ИП Ведёхина ЕВ
ИНН 771520411299
127282 Москва ул. Тихомирова, 2,
8 (499) 790-32-40

Врач: Дигина Наталья Викторовна

Анализы: УЗИ

Мочевой пузырь наполнен, содержимое анэхогенное, стенка одноконтурная толщина 0.13 см, включения не визуализируются.

УЗИ-признаки соответствуют норме.

Правая почка визуализируется, овальная, 4.19+ 2.94 см, корково-мозговая дифференциация не четкая, эхогенность слоев коркового и мозгового вещ-ва повышена. В мозговом слое визуализируется 1 киста с анэхогенным содержимым, размеры 1.29+1.56см. лоханка расширена (размеры 1.05+1.25см), уплотнена, не испускает эхотень. Мочеточник не визуализируется. Кровоснабжение норма.

УЗИ- признаки соответствуют нефропатии, нефрозу, ХПН, кисте почки.

Левая почка визуализируется, округлая,

3.83+3.35 см, контуры четкие, ровные, корково-мозговая дифференциация не четкая, эхогенность слоев коркового и мозгового вещ-ва повышена. В мозговом слое визуализируется 1 киста с анэхогенным содержимым, размеры 1.16+0.94см. Лоханка расширена (размеры 1.14++0.95см), уплотнена, не испускает эхотень. Мочеточник не визуализируется.

Кровоснабжение выраженное.

УЗИ-признаки соответствуют нефропатии, нефрозу, ХПН, кисте почки.

Селезенка

Расположение типичное. Толщина 1.43-3.37, увеличена. Контуры не ровные, не четкие. Эхоструктура не однородная, со множеством мелких соединительно тканных включений и пронизана сосудами. Эхогенность паренхимы повышенная. Кровеносные сосуды выражены, диаметр в среднем 0.51-0.62см. Образования не визуализируются.

Заключение: Узи-признаки соответствуют острому воспалению, н.о. селезенки

Печень

Расположение типичное. Подвижность при дыхательной экскурсии есть. Не выступает за край реберной дуги. Контуры ровные, четкие. Свободный край округлен. Капсула дифференцируется. Эхоструктура паренхимы не однородная, эхогенность

повышена, картина цийротических измерений. Сосудистый рисунок выражен, сосуды не расширены. Стенки сосудов повышенной эхогенностии. Образования не визуализируются.

Заключение: Узи-признаки соответствуют цейрозу, осторой интоксикации, гепатопатии.

Желчный пузырь

Визуализируется. Степень наполнения нормального. Расположение типичное. Диаметр 0.52 см. Содержимое однородное, анэхогенное. Образования не визуализируются.

Стенка не утолщена, нормальной эхогенности, одноконтурная.

Заключение: Узи-признаки соответствуют норме.

Брюшная полость

Желудок: натощак. Перистальтика есть, толщина стенки 0.36см, дифференциация слоев стенки сохранена, соотношение слоев стенки изменено в сторону подслизистого слоя. Складчатость ровная, четкая.

12- перстная кишка: перистальтика есть, толщина стенки 0.27см, дифференциация слоев стенки сохранена, соотношение слоев стенки изменено в сторону подслизистого слоя, просвет не расширен.

Поджелудочная железа не визуализируется.

Тонкий кишечник: слабая перистальтика, толщина стенки 0.18 см, просвет не расширен, дифференциация слоев сохранена, норма.

Толстый кишечник перистальтика слабая, толщина стенки 0.16 см, стенки нормальной эхогенности. Содержит некоторое количество плотных каловых масс. Просвет не расширен.

Свободная жидкость не визуализируется. Сальник повышенной эхогенности.

УЗИ-признаки соответствуют гастродуодениту.